

SF FLORISTICHE ITALIANE: 521-522

LATTANZI\*. Dipartimento di Biologia Vegetale, Università «La Sapienza», Roma, 19, Roma.

521. *Ceratophyllum demersum* L. (Ceratophyllaceae)

Precisazione.

REPERTO. Tenuta presidenziale di Castel Porziano (Roma), in una piscina a Tor Paterno, 15 Sep. 1986 (FI, k).

OSSERVAZIONI. Indicata come rarissima in PIGNATTI (*Fl. Ital.* 2: 2) nelle regioni d'Italia e per il Lazio solo alle Paludi Pontine (PIGNATTI, *Fl. Ital.* 2: 2). È stata raccolta anche altrove nella regione, e precisamente a Castel Fusano (TRAIANO, *Prod. Fl. Traiano* (Fiumicino, 1886), (RO!). È inoltre indicata da PIROTTA (in ABBADELANO, *Fl. Italia di Roma*, 1894) per i Monti Sabatini. Il rinvenimento a Castel Fusano è di recente accertato, pertanto va rettificata la citazione con la sigla NT (non rinvenuta in questo volume). (Prodr. *Fl. Roma*: 38, 1984), tanto più ora, dato l'attuale rinvenimento.

522. *Heliotropium supinum* L. (Boraginaceae)

Attuale presenza e nuova località nel Lazio.

REPERTO. Tenuta presidenziale di Castel Porziano (Roma), presso Via delle Riserve Nuove, 30 Sept. 1987, E. Lattanzi (FI, RO).

OSSERVAZIONI. Indicata come rarissima in PIGNATTI (*Fl. Ital.* 2: 2) nelle regioni d'Italia (Lazio incluso), è nota per questa Regione solo del secolo XIX (segnalazioni, quasi tutte confermate da exsiccata (RO!)), di vari Autori per le quali, dove poi non è stata rinvenuta. Una di queste è Castel Fusano (FIORI, *Località nuove*, Nuovo Gior. Bot. Ital., 40: 336, 1933), località assai prossima a quella dell'attuale rinvenimento.

SEGNALAZIONI FLORISTICHE ITALIANE: 523

G. TONDI e P. PLINI\*. Via A. Friggeri, 82 Roma; \* Via Altino, 8 Roma.

523. *Betula pendula* Roth (Betulaceae)

Seconda segnalazione per il Lazio.

REPERTO. Monti della Laga, Versante laziale in comune di Amatrice (RI), alle falde del Pizzo di Sevo in località F.so del Rio, m 1250-1425 s.l.m., esp. W-NW., 21 Nov 1987, Tondi et Plini (FI, RO).

OSSERVAZIONI. Una cinquantina di esemplari, isolati e ceppaie, alcuni di ragguardevoli dimensioni, con discreta rinnovazione naturale. La stazione copre un'area complessiva di circa

50 ha, con una pendenza media del 41%, nella fascia di transizione tra il Querceto misto e la Faggeta. La Betulla è diffusa, con popolamento disetaneo, all'interno di un ceduo composto, in consorzio con *Fagus sylvatica*, *Quercus cerris*, *Castanea sativa*, *Populus tremula*, *Salix caprea*, *Acer obtusatum*, *Juniperus communis*, *Rosa canina*, *Cytisus scoparius*, *Rubus glandulosus*, *Rubus idaeus*, *Pteridium aquilinum*, *Digitalis micrantha*, *Saxifraga rotundifolia*, *Lathyrus vernus*, *Neottia nidus-avis*.

In Italia, secondo PIGNATTI (1982), *Betula pendula* è distribuita nell'arco alpino e prealpino, dove è abbastanza comune, e in Appennino (Emilia, Marche, Toscana e Campania), con popolamenti sporadici e, spesso, introdotti. Inoltre, è certamente presente in Abruzzo.

Con sicurezza, la specie risulta segnalata nel Lazio solo per la Caldara di Manziana (ROMA), dove, però, sembra essere stata introdotta.

#### RELAZIONI FLORISTICHE ITALIANE: 524-533

G. PIRONE\*. Dipartimento di Botanica ed Ecologia, Università di Camerino; \* Via Montesilvano (Pe).

#### 524. *Plantago media* Forsskal (Plantaginaceae)

Specie nuova per il Molise e l'Abruzzo.

REPERTO. Valle del Trigno, presso Mafalda (Is), m 280 circa, 17 Apr 1987, F. Conti et G. Piro.

REPERTO. S. Salvo (Ch), in ambiente retrodunale, 5 Apr 1987, F. Conti et G. Piro.

OSSERVAZIONI. L'entità è nota per la Liguria e il Piemonte, precedentemente indicata in Italia per «le coste adriatiche dal basso Friuli al Molise ad Otranto, coste ioniche, Lazio ad Anzio, Sicilia e Sardegna» (PIGNATTI, *Fl. Ital.*, 1: 757, 1982).

#### 525. *Coronilla valentina* L. subsp. *marinosae* (CAME)

Specie nuova per il Molise.

REPERTO. Valle del Trigno, presso Mafalda (Is), m 280 circa, 17 Apr 1987, F. Conti et G. Pirone (FI, CAME).

OSSERVAZIONI. L'entità è nota per la Liguria e il Piemonte, precedentemente indicata in Italia per «le coste adriatiche dal basso Friuli al Molise ad Otranto, coste ioniche, Lazio ad Anzio, Sicilia e Sardegna» (PIGNATTI, *Fl. Ital.*, 1: 757, 1982).

#### 526. *Typha minima* Hoppe (Typhaceae)

Specie nuova per il Molise.

REPERTO. Rive del F. Trigno presso Mafalda (Is), m 280 circa, 17 Apr 1987, F. Conti et G. Pirone (FI, CAME).

OSSERVAZIONI. La specie è indicata per l'Italia settentrionale, Toscana, Marche, Lazio e Italia meridionale e risulta rara in tutto il territorio (PIGNATTI, *Fl. Ital.*, 3: 634, 1982).