

Riv. ital. Orn., Milano, 59 (3-4): 309-310, 15 - XII - 1989

SEGNALAZIONE DI BECCOFRUSONE, *Bombycilla garrulus*,
NEI MONTI DELLA LAGA (LAZIO)

ABSTRACT. — *A record of Waxwing, Bombycilla garrulus, in Latium (Central Italy).*

Il giorno 2 aprile 1989 alle ore 10.15, ho osservato un gruppo di 9 individui di Beccofrusone, *Bombycilla garrulus*, sul versante occidentale del Pizzo di Sevo (Monti della Laga, Appennino centrale) ad una quota di circa 1575 m. La zona coincide con la fascia di transizione tra il querceto misto e la faggeta ed è intercalata da vaste radure con radi cespugli.

La specie, migratrice parziale, compie spesso movimenti esplosivi che sono stati documentati e di cui si ha notizia in Italia a partire dal 1530 (MOLTONI 1969). Numerose altre segnalazioni per gli anni fino al 1976 sono riportate da MOLTONI (1971) e da MOLTONI & BRICHETTI (1976). Nella maggior parte dei casi si tratta di catture o osservazioni di individui isolati nel periodo compreso tra novembre e febbraio, ma nelle regioni dell'arco alpino sono stati a volte segnalati gruppi più numerosi (massimo 150 individui in Val Badia). Le segnalazioni più tardive sono relative a quattro individui osservati il 7.IV.1966 a Barletta (Bari) e ad un individuo osservato nel Parco Nazionale d'Abruzzo il 28.III.1975. Nell'autunno del 1988 è stata segnalata (WHITTINGTON & GLUE, 1989) una invasione in alcune zone della Gran Bretagna inquadrabile nell'ambito di un più vasto movimento di massa verso zone al di fuori dei limiti abituali della specie.

E' probabile che anche in altre località italiane siano stati osservati nell'autunno-inverno 1988-1989 individui di Beccofrusone. Tuttavia la presenza della specie sui Monti della Laga in un periodo successivo alla seconda metà di marzo, limite entro il quale sono concentrati la massima parte degli avvistamenti in Italia, è di particolare interesse.

BIBLIOGRAFIA

- CRAMP S. (ed.), 1988 - The Birds of the Western Palearctic, Vol. V.
MOLTONI E., 1969 - La comparsa in Italia del Beccofrusone - *Bombycilla garrulus garrulus* (L.) - nel 1963-1964, 1965-1966, 1967-1968 - *Riv. ital. Orn.*, 39: 1-25.
MOLTONI E., 1971 - Notizie riguardanti la comparsa in Italia del Beccofrusone - *Bombycilla g. garrulus* (L.) - nel 1970-71 - *Riv. ital. Orn.*, 41: 150-160.

- MOLTONI E. & BRICHETTI P., 1976 - Note riguardanti la comparsa in Italia del Beccofrusone - *Bombycilla garrulus* (L.) - negli autunni-inverni 1974-1975 e 1975-1976 - *Riv. ital. Orn.*, 46: 24-32.
- WHITTINGTON P. & GLUE D., 1989 - Waxwing arrive in force - *B.T.O. News*, 160, jan.-feb.: 1.

PAOLO PLINI

Stazione Romana Osservazione Protezione Uccelli, c/o Oasi Naturale WWF «Bosco di Palo», Via Palo Laziale 2, 00055 Ladispoli, Roma.

Riv. ital. Orn., Milano, 59 (3-4): 310-311, 15-XII-1989

OSSERVAZIONE DI ORCHETTO MARINO, *Melanitta nigra*, NEL GOLFO DI GENOVA

ABSTRACT. — *Observation of Common Scoter, Melanitta nigra, in the Gulf of Genoa.*
Historical and updated data for Liguria.

Riteniamo di interesse per la Liguria segnalare la presenza di una ♀ di Orchetto marino, che il 1° maggio 1989 verso le 8,30 osservammo ed uno di noi (Maranini) fotografò, nel tratto lagunare limitato da una ampia fascia di terrapieno del costruendo porto containers di Genova Voltri a Pra-Palmaro. L'individuo, che ha sostato per tutta la mattinata, nuotava di poco discosto da un gruppo di Edredoni, *Somateria mollissima*, e di un giovane ♂ di Re degli Edredoni, *Somateria spectabilis*.

Gli Autori del secolo scorso consideravano la specie di comparsa assai rara in Liguria: DURAZZO (1846) che la segnalava «casuale nel 1844» e GIGLIOLI (1886) menzionava 1 ind. nella collezione Lombardi a Genova Cornigliano, catturato in quei pressi nel 1858. Agli inizi di questo secolo già BOSCHETTI 1906, ne ammetteva l'accidentalità nell'interno ligure; la cattura di 1 ind. alle foci del Var (Nizzardo) nel maggio 1908 (esempl. nel Museo di Firenze) ed una, senza data (ex collezione De Negri), nel Museo di Milano con la generica indicazione «Liguria», sono ricordate da ARRIGONI (1929). In tempi più recenti vanno aggiunti:

- 1 ♂ giovane catturato a Genova Pegli nel marzo 1953 (Rossi 1955).
- 2 ind. ♂ e ♀ catturati in Val Magra (La Spezia) il 22 novembre 1954 (MOLTONI 1955).